

CHEMISEPT MED

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

Produktas paruoštas naudojimui.

Prieš dezinfekavimą, rankas gerai nuplauti su muilu ir nusausinti.

Higieninei rankų dezinfekcijai: ant švarių ir sausų rankų užpilti 3 ml produkto ir kruopščiai trinti 30 sek. Visą ekspozicijos laiką rankų oda turi būti drėgna. Leisti natūraliai išdžiūti. Nenuskalauti.

Chirurginei rankų dezinfekcijai: du kartus po 3 ml užpilti ant švarių ir sausų rankų ir trinti du kartus po 45 sek. Visą ekspozicijos laiką rankų oda turi būti drėgna. Leisti natūraliai išdžiūti. Nenuskalauti.

Chemisept Med mikrobiologinis poveikis: EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476:

Mikrobiologinis poveikis	Ekspozicijos laikas
Higieninė rankų dezinfekcija	30 sek
Chirurginė rankų dezinfekcija	90 sek
Baktericidinis (įsk. MRSA, VRE)	15 sek
Mielicidinis	15 sek
Mikobaktericidinis	20 sek
Virucidinis (Inkapsuluoti virusai, Norovirus, Rotavirus)	15 sek
Adenovirus	30 sek
Poliovirus	60 sek
Pilnas virucidinis	60 sek

Atsargumo priemonės

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai, žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.

Laikyti pašaliniamis neprieinamoje vietoje.

Laikyti pakuotę sandariai uždarytą, ne žemesnėje kaip +5 °C ir ne aukštesnėje kaip +25 °C temperatūroje, vengti tiesioginių saulės spindulių.