

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-220(A-0204PNO603819-21-122)
3 priedas

GLOBACID AF MED

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Globacid AF med paruoštas naudojimui. Skirtas nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros (ligoninės, poliklinikos, ambulatorijos, laboratorijos, procedūriniai kabinetai ir kt.), visuomeninės paskirties (grožio salonai, kirpyklos ir kt.) įstaigose ir maisto pramonės (maisto ruošimo, gamybos vietos ir kt.) įmonėse.

Dezinfekuojamus paviršius, įrengimus ir įrangą pilnai ir vienodai apipurkšti ar nušluostyti sudrėkinta Globacid AF med tirpalu servetėle; ekspozicijos laikas 30 sek. Esant adenoviruso grėsmei, ekspozicijos laikas 60 sek.

Grožio salonuose naudojamus instrumentus 60 sek. pamerkti į Globacid AF med tirpalą, ištraukus išdžiovinti arba nusausinti vienkartinėmis servetėlėmis.

A ir B kategorijų grožio paslaugoms teikti naudojamų daugkartinių instrumentų priežiūra turi atitikti HN 117:2007 reikalavimus.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniamis asmenims neprieinamoje vietoje.

Abejojant, kad Globacid AF med gali gadinti paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto.